

TESTCASUS 1 INTERACTIE:

RETINOIDEN + TETRACYCLINES (MFB 454)

Stappen

- Voer onderstaande geneesmiddelcombinatie in bij een testpatiënt.
 1. Doxycycline RIA disper tablet 100mg (ZI-nr 16972848); 1 maal per dag 1 tablet.
 2. Isotretinoïne capsule zacht 10mg (bijvoorbeeld ZI-nr 14738570); 2 maal per dag 2 tabletten.

- Komt er een signaal op?
 - a. Zo ja: er wordt adequaat bewaakt op de interactie.
 - b. Zo nee: bewaak handmatig. Zie hiervoor het document met een overzicht van de medicatiebewaking per artikel (ZI-nummer).

TESTCASUS 2 CONTRA-INDICATIE:

ZWANGERSCHAP: DOXYCYCLINE (MFB 3579)

Stappen

- Voer de contra-indicatie zwangerschap in bij een testpatiënt.
- Voer vervolgens onderstaand geneesmiddel in bij de testpatiënt.
 1. Doxycycline RIA disper tablet 100mg (ZI-nr 16972848); 1 maal per dag 1 tablet.

- Komt er een signaal op?
 - a. Zo ja: er wordt adequaat bewaakt op de contra-indicatie.
 - b. Zo nee: bewaak handmatig. Zie hiervoor het document met een overzicht van de medicatiebewaking per artikel (ZI-nummer).